


注意事項



あるこーる ^{くすり}薬と^{いっしょ}一緒に
の飲まないで

あ
るこしる
くすり
いっしょ
の
薬と一緒に
飲まないで

アルコールによって薬の作用が
強く表れることがあります

薬剤師業務（専門用語）



い ばしょ き
いつも行く 場所を決めよう
やっきよく
薬局も

い
つ
も
行
く
い

ば
し
よ
き

場
所
を
決
め
よ
う

や
つ
き
よ
く

薬
局
も

お薬を安心・安全に使うために
“かかりつけ薬局”を決めましょう



うがいする ^{くすり}薬もあるよ
の
飲まないで

うがいの薬もあつるよ
くすり
の
飲まないで

うがい薬(含嗽剤[がんそうざい])
は飲まないようにしましょう

薬剤師業務（専門用語）



あ

えらびましょう あなたに合ってる
ジェネリック

え
らびましよう
あ
あなたに合ってる
ジェネリック

ジェネリック医薬品とは、後発医薬品のことで値段の安いお薬です



おんしっふ ^{いた}いつもの痛み
^{おさ}抑えるよ

おんしっふ
いた
いつももの痛み
おさ
抑えるよ

温湿布〔おんしっふ〕は日常的な
痛みを抑える効果があります



かれんだー ^{くすり}薬 ^いを入れて
^{りよう}利用しよう

か

れんだー

くすり
い

薬を入れて

りよう

利用しよう

お薬カレンダーを利用してお薬を
確認しながら必ず服用しましょう





きつくても ^{かって}勝手に ^{りょう}量は
^か変えないで

き
つつくても
かっ
りよう
勝手に量は
か
変えな
いで

体調が悪くてもお薬は勝手に
増やしてはいけません

口内炎パッチ
患部に貼るだけ



くっつけて こうないえん 口内炎を
やっつける

くっつけて
口内炎を
やっつける

口内炎には軟膏のほかにも、
くっつけて治すお薬（パッチ剤）
が



の かくにん
けさすぐに 飲んだか確認

きしょうじやく
起床時薬

け
さ
す
ぐ
に
の
飲
ん
だ
か
確
認
き
し
よ
う
じ
やく
起
床
時
薬

起床時のお薬は朝起きたら
すぐに飲みましょう




こどもの手 ^て届い ^{とど}ちゃだめだ
おくすり
お薬に

こどもの手て
とど
届いちやだめだ
くすり
お薬に

危ないお薬もあるので子どもの
手がお薬に届かないように
しましょう

服用時間



さんじゅっぶん ^{まえ}前が ^{しょくぜん}食前
き っ
気を付けよう

① さ ん じ ゅ つ ぷ ん

まえ しよくぜん

前が食前

きつ

気を付けよう


食前のお薬はご飯を食べる
30分前に飲みましょう



したの下 ゆっくり溶かして
効き目増す

① したの下 した
と
ゆっくり溶かして
きめま
効き目増す

舌下錠 [ぜっかじょう] とは、
舌の下で溶かして飲むお薬です



の
すぐ飲もう
はんた
ご飯食べたら
わす
忘れずに

す
ぐ飲もうの
はんた
ご飯食べたら
わす
忘れずに

食直後のお薬はご飯を食べ終え
たらすぐに飲みましょう



せつめいしょ ^よ読んでお薬 ^{くすり}
の
飲みましょう

せ
つめいしよ
よ
くすり
の
読んでお薬
の
飲みましよう

お薬の説明書は必ず読むように
しましょう



そのままの ^の カプセル飲もう
_あ 開けないで

① そのままの
の
カプセル飲もう
あ
開けないで

カプセル剤は開かず、そのまま
飲みましょう



たいしつじょうほうの アレルギー情報

じゅうよう
重要だ

た

いしつ
の

じょうほう


アレルギー情報

じゅうよう

重要だ

アレルギー情報を知ることによって副作用を防ぐことができます

服用時間



ちやくぜんは ^{はん た} ご飯を食べる
^{まえ} すぐ前だ

ち

よくぜんは

はん た

ご飯を食べる

まえ

すぐ前だ

食直前のお薬はご飯を食べる
すぐ前に飲みましょう



の
つつみこみ 飲みやすくする
オブライト

① つみこみ
の
飲みやすくする
オブラート

お薬をオブラートで包み水に
浸すと、ドロツとなるので
飲みやすくなります

薬剤師業務（専門用語）



てちょうはね あなたを^{まも}守る
^{ぶき}武器になる

て
ちようはね


まも

あなたを守る

ぶき

武器になる

お薬の情報が載っている
お薬手帳は、いざというときの
ために持ち歩きましょう



とろーちは ^な 舐 ^き め ^め て 効 ^き 目 ^め が
^{さいだい}
最大だ

とろーちは
な き め
舐めて効き目が
さいだい
最大だ

トローチとは、噛まないで
ゆっくり口の中で溶かすことで
効き目を表すお薬です



なんにでも ^あ合うわけないよ
^{くすり}お薬は

な
ん
に
で
も

あ
合
う
わ
け
な
い
よ

お
薬^{くすり}
は

薬は飲み合わせによって効果が強くなったり弱くなったりするので注意が必要です



の
にんぷさん 飲んではいけない
くすり
薬あり

①にんぷさん
の
飲んではいけない
くすり
薬あり

妊娠している人は飲んではならない薬があるため注意しましょう



ぬりぐすり ^き決まった ^{りょう}量を
^{つか}使ってね

ぬ

りぐすり

き

決まった量を

りよう

つか

使ってね

塗り薬は決まった量を使いましょう



まえ すこ まえ
ねる前の 少し前から
の くすり
飲む薬

ねる前の
まえ
すこ
まえ
少し前から
の
くすり
飲む薬

就寝前のお薬は眠る 30 分前に
飲みましょう

薬剤師業務（専門用語）



のこったら ^{おし}すぐに教えて
やくざいし
薬剤師

のこつたら
おし
すぐに教えて
やくざいし
薬剤師

お薬が残ったら調整など出来ますので薬剤師に教えてください



はなしてね あなたの^{せいかつ}生活
まも
守りたい

は
なしてね

あなた
の生活


まも

守りたい

せいかつ

病気、お薬や健康に関する何気ない情報も薬剤師に話をしましょう

薬剤師業務（専門用語）



ひとつずつ 減らしていこう

くすり
お薬を

ひ
とつづつ
へ
減らし
て
くすり
お薬を

飲むお薬を 1 つでも減らせるよ
うに、みんなで相談しましょう



ふ^{こうか}つてから 効^{しめ}果を示す

けんたくざい
懸濁劑

ふってから

こうか しめ

効果を示す

けんだくざい


懸濁剤

懸濁剤〔けんだくざい〕とは、よく振ってから飲むお薬です

注意事項



へらしたり ^{かって} 勝手に ^{ちょうせい} 調整
いけないよ



へらしたり

かって

ちようせい

勝手に調整

いけないよ

お薬は減らしたり残したりせず
決まった量を全て飲みましょう



ほう ただ まも
ほかん法 正しく守ろう
かくにん
確認だ

ほかん法 ほう
ただ まも
正しく守ろう
かくにん
確認だ

お薬は保管方法によっては
悪くなることがあるので
気をつけましょう



まもってね くすり の かた 飲み方
その こすう 個数

まもってね

くすりのかた

薬の飲み方

こすう

その回数

お薬の用法・用量は
必ず守りましょう



の
みずなしで 飲みやすくする
ざい
トロミ剤

みずなしで
の
飲みやすくする
がい
トロミ剤

トロミ剤とは、水を必要とせず
にお薬を飲みやすくします

薬剤師業務（専門用語）



むりはダメ くすり お薬 か 買って
セルフケア

むり
りはダメ
くすりか
お薬買って
セルフケア

セルフケア（セルフメディケーション）とは、自分の病気を市販薬を使って治すことです



めぐすりは ^{いってき}一滴ずつで
^き効くんだよ

めぐすりは
いってき
一滴ずつで
き
効くんだよ

めぐすりは1滴で
効果を示します



もうやめて たばこにドラッグ
ゆうがい
有害だ

も
うやめて
たばこにドラッグ
ゆうがい
有害だ

タバコやドラッグは体に有害
なので止めましょう

薬剤師業務（専門用語）



やくざいし ^{くすり}薬のプロだ
まか
任せてね

や

くざいし


くすり

薬のプロだ

まか

任せてね

薬剤師はお薬の
プロフェッショナルなので
お薬については頼って下さい



ゆっくと ^と溶けて ^き効かせて

ほうかいじょう
崩壊錠

ゆっくりと
と き
溶けて効かせて
ほうかいじょう
崩壊錠

崩壊錠〔ほうかいじょう〕とは、
口の中で溶けるので水なしで
飲むことのできるお薬です



ようきはね ^{うつ} ^か 移し替えない
^{まも} 守ろうね

よ
う
き
は
ね

う
つ
か

移
し
替
え
な
い

ま
も

守
ろ
う
ね

容器を勝手に移し替えると
お薬の効果が弱くなるので、
そのまま使用しましょう

薬剤師業務（専門用語）



らっきーだ やくざいし マイ薬剤師

きょう 今日もいる

らつきーだ
やくざいし
マイ薬剤師
きょう
今日もいる

お薬を安心・安全に使うために
“かかりつけ薬剤師”を
作りましょう



しょうじょうで
りようして 症状出たら
とんぷくやく
頓服薬

①りようして


しようじようで

症状出たら

とんぷくやく

頓服薬

頓服薬〔とんぷくやく〕とは、
決まった時間ではなく症状が
出たときに飲むお薬です



るーるだよ ^{しょっかん} ^{はん} 食間ご飯の
にじかんご
二時間後

るーるだよ

しよっかんはん

食間ご飯の

にじかんど

二時間後

食間のお薬はご飯の2時間後に
飲みましょう



れいしっぷ ^{きゆう} 急 ^{いた} な痛みを
^{やわ} 和らげる

れいしつぶ
きゆういた
急な痛みを
やわ
和らげる

冷湿布 [れいしつぶ] は急な痛み
を抑える効果があります



ろうれいしゃ ^{くすり}薬の ^{りょう}量に
き っ
気を付けて

ろ
う
れ
い
し
し
や

く
す
り

り
よ
う

薬の量に

き
っ

気を付けて

ご高齢な方はお薬の効果が
強く出たりするので
お薬の量に注意しましょう



わすれたら かくにん 確認しよう
タイミング

わすれたら
かくにん
確認しよう
タイミング

お薬を飲み忘れた際のタイミング
についてはあらかじめ薬剤師に
確認しておきましょう

薬剤師業務（専門用語）



けつあつかくにん
をつうじや 血圧確認

やくざいし
薬剤師

を つうじや
けつあつかくにん
血圧確認
やくざいし
薬剤師

薬剤師はお薬の効果や副作用の
確認のために聴診器や医療機器
を使用することもあります



んだもしたん んではじまる

くすり

薬なし

ん
だもしたん
んで
はじまる
くすり
薬なし

“ん”で始まる薬はありません！
（「んだもした～ん」は「おや
まあ！」という意味の鹿児島弁）