

大項目	学習者の行動	確認項目 (行動記録)	1Aセリア (薬局薬剤師)	1Bセリア (薬局薬剤師)
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	薬局生の〇〇と申します。	薬局生の〇〇と申します。
	患者氏名	患者氏名 (フルネーム) を確認する	芳山 和子 (よしやま かずこ) さんですね。	芳山 和子 (よしやま かずこ) さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきますのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきますのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	食事は毎朝とれてます。
	排便状況	排便 (排便、排便) を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行けています。
服薬状況の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	お薬はありますか？	毎日入っています。
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	お薬は効いているでしょうか？
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	お薬は効いているでしょうか？
体調・薬効・副作用の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	現在の体調はいかがですか？
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？
	薬の副作用	処方薬の副作用を確認する	処方されたお薬の副作用はありますか？	処方されたお薬の副作用はありますか？
脈拍の確認	顔色・表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	顔色など問題はないようですね。	顔色など問題はないようですね。
	機音動脈の聴診	機音動脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
心音の確認	不整脈	不整脈の有無を確認する	不整脈はありません。	不整脈はありません。
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は72回です。	脈拍数は80回です。
	観察・ベル型	観察・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。
呼吸状態の確認	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
血圧の確認	吸気・呼気	同一部で吸気・呼気の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右を交互に聴取する	OK	OK
	上肺・中肺・下肺	前胸部全体を聴取する	OK	OK
聴音の確認	肺音の所見	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	捻発音が聞こえます。
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は15回です。	呼吸数は20回です。
	上腕動脈聴知	上腕動脈を適切に聴診する	血圧を測らせてくださいね。	血圧を測らせてくださいね。
浮腫の確認	マンシエツ	マンシエツを適切に巻ける	OK	OK
	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧値を推測する	(115とメモ)	(120とメモ)
	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
聴音の確認	内圧調整	マンシエツの内圧を適切に上げ下げする	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見 (収縮期と拡張期血圧) を推測する	収縮期血圧が115、拡張期血圧が75です。	収縮期血圧が122、拡張期血圧が79です。
	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
浮腫の確認	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き (音) の所見を推測する	異常はありません。	異常はありません。
	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
体温の確認	5秒以上圧迫	5秒以上の圧迫を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね、36.2℃です。	それでは体温を測りますね、38.1℃です。
SpO2の測定	SpO2の所見	SpO2を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、99%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、89%です。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおりにしっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
	コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	身だしなみ
コミュニケーション	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き
	声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調
コミュニケーション	言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい
	積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴
	共感・態度	共感の言葉かけ・態度	共感の言葉かけ・態度	共感の言葉かけ・態度
コミュニケーション	患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮
	コミュニケーション	コミュニケーション	コミュニケーション	コミュニケーション
	コミュニケーション	コミュニケーション	コミュニケーション	コミュニケーション

大項目	学習者の行動	確認項目（行動記録）	2Aセリア（薬局薬剤師）	2Bセリア（薬局薬剤師）
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	薬剤士の〇と申します。	薬剤士の〇と申します。
	患者氏名	患者氏名（フルネーム）を確認する	里 泉（ほし いずみ）さんですね。	里 泉（ほし いずみ）さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	お食事は毎回とれています。
	排便状況	排便（排便、排便）を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行けています。
服薬状況の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	服薬はいつがですか？	服薬はいつがですか？
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	痛みをとる薬と聞いています。
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	1日3回毎食後に1錠飲むんですよね。
体調・薬効・副作用の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	腰が痛いんです。
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
脈拍の確認	顔色/表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	顔色など問題はないようですね。	顔色など問題はないようですね。
	機音動脈の聴診	機音動脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
心音の確認	不整脈	不整脈の有無を確認する	-	-
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は60回です。	脈拍数は68回です。
	聴型・ベル型	聴型・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。
呼吸状態の確認	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
血圧の確認	吸気・呼吸	同一部で吸気・呼吸の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右差を確認する	OK	OK
	上肺・中肺・下肺	前胸部全体を聴取する	OK	OK
聴音の確認	肺音の所見	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	湿啰音が聞こえます。
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は12回です。	呼吸数は10回です。
	上腕動脈聴知	上腕動脈を適切に聴診する	血圧を測らせてくださいね。	血圧を測らせてくださいね。
浮腫の確認	マンシエット	マンシエットを適切に巻ける	OK	OK
	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧値を推測する	(108とメモ)	(120とメモ)
	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
聴音の確認	内圧調整	マンシエットの内圧を適切に上げ下げする	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見（収縮期と拡張期血圧値）を推測する	収縮期血圧が108、拡張期血圧が63です。	収縮期血圧が120、拡張期血圧が75です。
	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
浮腫の確認	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き（音）の所見を推測する	異常はありません。	異常はありません。
	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
体温の確認	5秒以上圧迫	5秒以上の圧迫を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね、36℃です。	それでは体温を測りますね、37.3℃です。
SpO <sub>2</sub> の測定	SpO <sub>2</sub> の所見	SpO <sub>2</sub> を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、97%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、94%です。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおりにしっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
	コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	身だしなみ
コミュニケーション	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き
	声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい
	言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい
	積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴
	共感・態度	共感の言葉かけ・態度	共感の言葉かけ・態度	共感の言葉かけ・態度
	患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮

大項目	学習者の行動	確認項目（行動記録）	3Aセリア（薬局薬剤師）	3Bセリア（薬局薬剤師）
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	実習生の(?)と申します。	実習生の(?)と申します。
	患者氏名	患者氏名(フルネーム)を確認する	内藤 薫(うちうま かおる)さんですね。	内藤 薫(うちうま かおる)さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音を測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音を測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	お食事は毎回とれています。
	排便状況	排便(排便、排便)を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行っています。
服薬状況の確認	服薬状況	服薬について確認する	服りはありますか？	あまり服れていません。
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	飲んでいるお薬はどのような効果があるかお分かりですか？
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	クラリスロマイシンは1日2回朝食後と夕食後、L-カルボシステインは1日3回毎食後に1錠ずつ飲むんですね。
体調・薬効・副作用の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	現在の体調はいかがですか？
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
脈拍の確認	脈拍の聴診	脈拍を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
	左右差	左右差を確認する	左右差はありますか？	左右差はありますか？
	不整脈	不整脈の有無を確認する	不整脈はありますか？	不整脈はありますか？
心音の確認	胸骨・ベル型	胸骨・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。
	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえませんか？	異常な音は聞こえませんか？
呼吸状態の確認	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
	吸気・呼気	同一部で吸気・呼気の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右を交互に聴取する	OK	OK
血圧の確認	上腕・中肺・下肺	前胸部全体を聴取する	OK	OK
	肺音の所見	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえませんか？	異常な音は聞こえませんか？
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は30回です。	呼吸数は18回です。
聴診の確認	上腕動脈聴知	上腕動脈を適切に聴診する	血圧を測らせてくださいね。	血圧を測らせてくださいね。
	マンシエット	マンシエットを適切に巻く	OK	OK
	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧を推測する	(124とメモ)	(128とメモ)
浮腫の確認	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	内圧聴診	マンシエットの内圧を適切に上げ下げする	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見(収縮期と拡張期血圧)を推測する	収縮期血圧が124、拡張期血圧が80です。	収縮期血圧が128、拡張期血圧が84です。
浮腫の確認	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き(音)の所見を推測する	異常はありません。	異常はありません。
体温の確認	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
	5秒以上圧指	5秒以上の圧指を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
SpO2の測定	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね。38.8℃です。	それでは体温を測りますね。37.4℃です。
	SpO2の測定	SpO2を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。95%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。96%です。
	終了	締めくり挨拶	患者へ締めくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおしりっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ		
	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい		
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き		
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調			
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい			
積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴			
共感・態度	共感の言葉がけ・態度			
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮			

大項目	学習者の行動	確認項目（行動記録）	4Aセリア（薬局薬剤師）	4Bセリア（薬局薬剤師）
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	実習生の〇〇と申します。	こんにちは。
	患者氏名	患者氏名（フルネーム）を確認する	佐倉 緑（さくら つばき）さんですね。	佐倉 緑（さくら つばき）さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	食事の摂取状況はいかがですか？	食事は毎回とれています。
	排便状況	排便（排便、排便）を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行っています。
服薬状況の確認	睡眠状況	睡眠について確認する	眠りはいかがですか？	眠りはいいのですが？
	入浴状況	入浴について確認する	お風呂はいつがですか？	毎日入っています。
	不自由な状況	生活上の不自由の有無を確認する	生活をしているうえで不自由なことはありますか？	生活をしているうえで不自由なことはありますか？
体調・薬効・副作用の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	-	-
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	糖尿病の薬と聞いています。
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	飲んでいるお薬はどのような効果があるかお分かりですか？
脈拍の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	体調は良いです。
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
心音の確認	気持ち・不安	患者の気持ちや不安について尋ねる	今の状況についてどのように思っていますか？不安などありますか？	いつまで薬を飲み続けるのかと考えると不安です。
	顔色・表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	顔色など問題は無いようですね。	顔色など問題は無いようですね。
	聴音聴脈の聴診	聴音聴脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
呼吸状態の確認	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
	不整脈	不整脈の有無を確認する	不整脈はありません。	不整脈はありません。
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は68回です。	脈拍数は108回です。
血圧の確認	聴音・ベル型	聴音・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。
	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	III音とIV音が聞こえます。
肺音の確認	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
	吸気・呼気	同一部で吸気・呼気の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右を交互に聴取する	OK	OK
聴音の所見	上肺・中肺・下肺	前胸部全体を聴取する	OK	OK
	肺音の所見	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	水泡音が聞こえます。
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は18回です。	呼吸数は24回です。
聴診器を用いた聴診	上腕動脈聴知	上腕動脈を適切に聴診する	血圧を測らせてくださいね。	血圧を測らせてくださいね。
	マンシエット	マンシエットを適切に巻く	OK	OK
	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧を推測する	(132とメモ)	(184とメモ)
聴診器を用いた聴診	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	内圧調整	マンシエットの内圧を適切に上げ下げする	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見（収縮期と拡張期血圧）を推測する	収縮期血圧が132、拡張期血圧が82です。	収縮期血圧が184、拡張期血圧が110です。
聴診器を用いた聴診	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
	適切な時間	一定時間の音を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き（音）の所見を推測する	異常はありません。	異常はありません。
浮腫の確認	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
	5秒以上圧指	5秒以上の圧指を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみがあります。
体温の確認	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね。36.1℃です。	それでは体温を測りますね。36.6℃です。
	SpO <sub>2</sub> の測定	SpO <sub>2</sub> を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。97%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。90%です。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおしりっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	身だしなみ	身だしなみ
	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい
積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴
共感・態度	共感の言葉がけ・態度	共感の言葉がけ・態度	共感の言葉がけ・態度	共感の言葉がけ・態度
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮

大項目	学習者の行動	確認項目 (行動記録)	5Aセリア (薬局薬剤師)	5Bセリア (薬局薬剤師)
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	薬局生のことと申します。	薬局生のことと申します。
	患者氏名	患者氏名 (フルネーム) を確認する	遠町 一太 (よかまち かずお) さんですね。	遠町 一太 (よかまち かずお) さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきますのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきますのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	お食事は毎回とれています。
	排便状況	排便 (排便、排便) を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行けています。
服薬状況の確認	睡眠状況	睡眠について確認する	眠りはいいですか？	眠りはいいですか？
	入浴状況	入浴について確認する	お風呂はいかがですか？	お風呂はいいのですが？
	不自由な状況	生活上の不自由の有無を確認する	生活をしているうえで不自由なことはありますか？	生活をしているうえで不自由なことはありますか？
服薬状況の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	-	-
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	糖尿病の薬と聞いています。
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	飲み方は1日3回朝食前1錠、シタグリブチンは1日1回朝食前に1錠飲むんですね。
体調・薬効・副作用の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	体調は良いです。
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の前作用	処方薬の前作用を確認する	-	-
脈拍の確認	気持ち・不安	患者の気持ちや不安について尋ねる	今の状況についてどのように思っていますか？不安などありますか？	いつまで薬を飲み続けるのかと考えると不安です。
	顔色/表情/全身	顔色・表情・全身を観察する	顔色など問題はないようですね。	はい。
	機音動脈の触診	機音動脈を適切に触診する	脈拍を測らせてくださいね。	はい。
心音の確認	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
	不整脈	不整脈の有無を確認する	不整脈はありません。	不整脈はありません。
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は59回です。	脈拍数は58回です。
呼吸状態の確認	観察・ベル型	観察・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	はい。
	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
呼吸状態の確認	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	はい。
	吸気・呼気	同一部で吸気・呼気の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右を交互に聴取する	OK	OK
血圧の確認	上肺・中肺・下肺	前胸部全体を聴取する	OK	OK
	肺音の所見	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は15回です。	呼吸数は16回です。
血圧の確認	上腕動脈触知	上腕動脈を適切に触診する	血圧を測らせてくださいね。	はい。
	マンシエット	マンシエットを適切に巻ける	OK	OK
	触診法での推測	触診法で収縮期血圧値を推測する	(117とメモ)	(119とメモ)
聴音の確認	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	内圧調整	マンシエットの内圧を適切に上げ下げする	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見 (収縮期と拡張期血圧値) を推測する	収縮期血圧が117、拡張期血圧が73です。	収縮期血圧が119、拡張期血圧が73です。
浮腫の確認	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	はい。
	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き (音) の所見を推測する	異常はありません。	お腹の音は聞こえません。
浮腫の確認	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	はい。
	5秒以上圧留	5秒以上の圧留を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
体温の確認	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね、36.7℃です。	はい。
	SpO <sub>2</sub> の測定	SpO <sub>2</sub> の所見	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、98%です。	はい。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおりにしっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	-	-
	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	-	-
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	-	-
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	-	-	
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	-	-	
積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	-	-	
共感・態度	共感の言葉かけ・態度	-	-	
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	-	-	

大項目	学習者の行動	確認項目 (行動記録)	6Aセリア (薬局薬剤師)	6Bセリア (薬局薬剤師)
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	実習生の(自)と申します。	実習生の(自)と申します。
	患者氏名	患者氏名 (フルネーム) を確認する	堀川 春樹 (ほりかわ しょう) さんですね。	堀川 春樹 (ほりかわ しょう) さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	お食事は毎朝とれています。
	排便状況	排便 (排便、排便) を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行けています。
服薬状況の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	-	-
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	中耳炎の薬と聞いています。
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	アモキシシリンは1日3回毎直後に1カプセル、カロナールは熱が出た時に1錠飲むんですね。
体調・薬効・副作用の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	耳の奥が痛く、熱っぽいです。
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
脈拍の確認	脈拍の所見	脈拍の所見を確認する	脈拍数を54回です。	脈拍数は58回です。
	顔色・表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	お顔が赤いですね。	お顔が赤いようですね。
	聴音動脈の聴診	聴音動脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
心音の確認	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
	呼吸音の聴診	呼吸音の聴診	呼吸音を適切に聴診する	呼吸音は11回です。
血圧の確認	血圧の所見	血圧の所見 (聴診法と収縮期・拡張期) を推測する	収縮期血圧が120、拡張期血圧が75です。	収縮期血圧が124、拡張期血圧が78です。
	聴診法の推測	聴診法で収縮期・拡張期を推測する	(120とメモ)	(124とメモ)
	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
聴音の確認	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	聴音の所見	聴音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
浮腫の確認	浮腫の所見	浮腫の所見を確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
	体温の確認	体温を測定する	それでは体温を測りますね、39℃です。	それでは体温を測りますね、37.1℃です。
SpO2の測定	SpO2の所見	SpO2を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、99%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、99%です。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ありがとうございます。お薬を飲むことで次第に耳の痛みや高熱はなくなると思っています。
	コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	適切な姿勢・ふるまひ
姿勢・ふるまひ	適切な姿勢・ふるまひ	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	
アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	適切な声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	
積極的な傾聴	開放型質問等を用いた積極的な傾聴	共感・態度	共感の言葉かけ・態度	
共感・態度	共感の言葉かけ・態度	患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮			

大項目	学習者の行動	確認項目（行動記録）	7Aセリア（薬局薬剤師）	7Bセリア（薬局薬剤師）
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	実習生の〇〇と申します。	実習生の〇〇と申します。
	患者氏名	患者氏名（フルネーム）を確認する	過川 亨（ゆかわ たく）さんですね。	過川 亨（ゆかわ たく）さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	お食事の摂取状況はいかがですか？
	排便状況	排便（排便、排便）を確認する	お通じやおしっこのお出はいかがですか？	お通じやおしっこのお出はいかがですか？
服薬状況の確認	睡眠状況	睡眠について確認する	眠りはいかがですか？	眠りはいかがですか？
	入浴状況	入浴について確認する	お風呂はいかがですか？	お風呂はいかがですか？
	不自由な状況	生活上の不自由の有無を確認する	生活をしているうえで不自由なことはありますか？	生活をしているうえで不自由なことはありますか？
体調・薬効・副作用の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	-	-
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	飲んでいるお薬はどのような効果があるかお分かりですか？
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	飲んでいるお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？
脈拍の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	現在の体調はいかがですか？
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
心音の確認	気持ち・不安	患者の気持ちや不安について尋ねる	今の状況についてどのように感じますか？不安などありますか？	今の状況についてどのように感じますか？不安などありますか？
	顔色・表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	顔色など問題は無いようですね。	顔色が赤いですね。
	聴音動脈の聴診	聴音動脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
呼吸状態の確認	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
	不整脈	不整脈の有無を確認する	不整脈もありません。	不整脈もありません。
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は78回です。	脈拍数は48回です。
血圧の確認	聴音・ベル型	聴音・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。
	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
聴音の所見	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
	吸気・呼気	同一部で吸気・呼気の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右を交互に聴取する	OK	OK
聴音の所見	上脚・中脚・下脚	前胸部全体を聴取する	OK	OK
	前胸部の聴診	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は14回です。	呼吸数は8回です。
聴音の所見	上腕動脈聴知	上腕動脈を適切に聴診する	血圧を測らせてくださいね。	血圧を測らせてくださいね。
	マンシエット	マンシエットを適切に巻く	OK	OK
	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧を推測する	(110とメモ)	(84とメモ)
聴音の所見	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	内圧調整	マンシエットの内圧を適切に上げ下げる	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見（収縮期と拡張期血圧）を推測する	収縮期血圧が110、拡張期血圧が64です。	収縮期血圧が84、拡張期血圧が48です。
聴音の所見	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き（音）の所見を推測する	減少しています。	異常はありません。
浮腫の確認	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
	5秒以上圧指	5秒以上の圧指を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
体温の確認	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね、36.7℃です。	それでは体温を測りますね、37.6℃です。
	SpO <sub>2</sub> の測定	SpO <sub>2</sub> を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、97%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね、90%です。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおしりっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	-	-
	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	-	-
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	-	-
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	-	-	
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	-	-	
積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴	-	-	
共感・態度	共感の言葉がけ・態度	-	-	
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	-	-	

大項目	学習者の行動	確認項目（行動記録）	8Aセリア（薬局薬剤師）	8Bセリア（薬局薬剤師）
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	薬剤師の心と申します。	薬剤師の心と申します。
	患者氏名	患者氏名（フルネーム）を確認する	青藤 遼斗（あおばやし めんた）さんですね。	青藤 遼斗（あおばやし めんた）さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の説明を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	お食事の摂取状況はいかがですか？	お食事は毎回とれています。
	排便状況	排便（排便、排便）を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じは毎朝あります。おしっこも1日8回程度行けています。
服薬状況の確認	睡眠状況	睡眠について確認する	眠りはいかがですか？	あまり眠れていません。
	入浴状況	入浴について確認する	お風呂はいかがですか？	毎日入っています。
	不自由な状況	生活上の不自由の有無を確認する	生活をしているうえで不自由なことはありますか？	今の状況が少しつらいです。
体調・薬効・副作用の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	-	お薬は飲んでいます。
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	心不全の薬と聞いています。
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	飲んでいるお薬はどのような効果があるかお分かりですか？
脈拍の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	息切れがして動悸があります。
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
心音の確認	気持ち・不安	患者の気持ちや不安について尋ねる	今の状況についてどのように思っていますか？不安などありますか？	いつまで続くのかと考えると不安です。
	顔色・表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	顔色や表情はありますか？	お顔が赤いですね。
	聴音動脈の聴診	聴音動脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
呼吸状態の確認	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
	不整脈	不整脈の有無を確認する	脈拍もありません。	脈拍がたまに抜けます。
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は72回です。	脈拍数は92回です。
血圧の確認	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧を推測する	(104とメモ)	(86とメモ)
	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	内圧聴診	マンシェットの内圧を適切に上げ下げる	OK	OK
聴音の確認	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き（音）の所見を推測する	異常はありません。	異常はありません。
浮腫の確認	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
	5秒以上圧指	5秒以上の圧指を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみがあります。	むくみはありません。
SpO <sub>2</sub> の測定	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね。36.2℃です。	それでは体温を測りますね。37.1℃です。
	SpO <sub>2</sub> の測定	SpO <sub>2</sub> を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。95%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。88%です。
	終了	締めくり挨拶	患者へ締めくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおしりっかりとお薬を飲んでいきましようね。
コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ	-	-
	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい	-	-
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き	-	-
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調	-	-	
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい	-	-	
積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴	-	-	
共感・態度	共感の言葉がけ・態度	-	-	
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮	-	-	



大項目	学習者の行動	確認項目（行動記録）	10Aセリフ（病院薬剤師）	10Bセリフ（薬局薬剤師）
はじめに	挨拶	患者へ挨拶ができる	こんにちは。	こんにちは。
	自己紹介	自己紹介ができる	実習生のつと申します。	実習生のつと申します。
	患者氏名	患者氏名（フルネーム）を確認する	山本・サミジ（やまもと もみじ）さんですね。	山本・サミジ（やまもと もみじ）さんですね。
生活状況の確認	目的・同意	インタビュー・アセスメントの目的を告げ、同意を得る	体調とお薬の説明をさせていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。	体調とお薬の効果を確認させていただくためにお話しを伺い、脈、血圧や聴診音などを測らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
	食事状況	食事について確認する	食事の摂取状況はいかがですか？	食事の摂取状況はいかがですか？
	排便状況	排便（排便、排便）を確認する	お通じやおしっこの出はいかがですか？	お通じやおしっこの出はいかがですか？
服薬状況の確認	睡眠状況	睡眠について確認する	眠りはいかがですか？	眠りはいかがですか？
	入浴状況	入浴について確認する	お風呂はいかがですか？	お風呂はいかがですか？
	不自由な状況	生活上の不自由の有無を確認する	生活をしているうえで不自由なことはありますか？	生活をしているうえで不自由なことはありますか？
体調・薬効・副作用の確認	服薬状況	服薬状況を口頭で確認する	-	-
	服薬の目的理解	服薬の目的を理解しているかを確認する	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？	処方されたお薬はどのような効果があるかお分かりですか？
	用法・用量理解	用法・用量を理解しているかを確認する	処方されたお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？	飲んでいるお薬の飲むタイミングと量はお分かりですか？
脈拍の確認	体調	体調について口頭で確認する	現在の体調はいかがですか？	現在の体調はいかがですか？
	薬の効果	処方薬の効果を確認する	-	-
	薬の副作用	処方薬の代表的な副作用を確認する	-	-
心音の確認	気持ち・不安	患者の気持ちや不安について尋ねる	今の状況についてどのように思っていますか？不安などありますか？	今の状況についてどのように思っていますか？不安などありますか？
	顔色・表情/全身	顔色・表情、全身を観察する	顔色に異常はないようですね。	顔色に異常はないようですね。
	聴音聴脈の聴診	聴音聴脈を適切に聴診する	脈拍を測らせてくださいね。	脈拍を測らせてくださいね。
呼吸状態の確認	左右差	左右差を確認する	左右差はありません。	左右差はありません。
	不整脈	不整脈の有無を確認する	不整脈はありません。	不整脈はありません。
	脈拍の所見	脈拍数を正しく測定する	脈拍数は75回です。	脈拍数は104回です。
血圧の確認	聴音・ベル型	聴音・ベル型で聴取する	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。	胸と音と呼吸の音を聴かせてくださいね。
	心基部・心尖部	心基部・心尖部を聴取する	OK	OK
	心音の所見	心音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
聴音の確認	深呼吸の指示	患者へ適切に深呼吸の指示をする	大きく呼吸をしてください。	大きく呼吸をしてください。
	吸気・呼気	同一部で吸気・呼気の両方を聴取する	OK	OK
	左右差	左右を交互に聴取する	OK	OK
聴音の確認	上肺・中肺・下肺	前胸部全体を聴取する	OK	OK
	肺音の所見	呼吸音の所見を推測する	異常な音は聞こえません。	異常な音は聞こえません。
	呼吸数の所見	呼吸数を測定する	呼吸数は18回です。	呼吸数は18回です。
聴音の確認	上腕動脈聴知	上腕動脈を適切に聴診する	血圧を測らせてくださいね。	血圧を測らせてくださいね。
	マンシエット	マンシエットを適切に巻く	OK	OK
	聴診法での推測	聴診法で収縮期血圧を推測する	(128とメモ)	(128とメモ)
聴音の確認	適切な位置での聴診	聴診器を適切な位置に当てる	OK	OK
	内圧調整	マンシエットの内圧を適切に上げ下げする	OK	OK
	血圧の所見	血圧の所見（収縮期と拡張期血圧）を推測する	収縮期血圧が128、拡張期血圧が74です。	収縮期血圧が128、拡張期血圧が72です。
聴音の確認	適切な位置	聴診器を適切な位置に当てる	お腹の音を聴かせてくださいね。	お腹の音を聴かせてくださいね。
	適切な時間	一定時間の音の有無を聴取する	OK	OK
	腸音の所見	腸の動き（音）の所見を推測する	異常はありません。	異常はありません。
浮腫の確認	適切な位置	適切な位置で確認する	むくみを確認しますね。	むくみを確認しますね。
	5秒以上圧指	5秒以上の圧指を行う	OK	OK
	浮腫の所見	浮腫の所見を推測する	むくみはありません。	むくみはありません。
体温の確認	体温の所見	体温を測定する	それでは体温を測りますね。36.3℃です。	それでは体温を測りますね。36.4℃です。
	SpO <sub>2</sub> の測定	SpO <sub>2</sub> を測定する	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。97%です。	血液中の酸素濃度を測らせてくださいね。96%です。
	終了	締めくくり挨拶	患者へ締めくくりの挨拶ができる	ご苦労様でした。それでは指示されたとおりにしっかりとお薬を飲んでいきましょうね。
コミュニケーション	身だしなみ	身だしなみ		
	姿勢・ふるまい	適切な姿勢・ふるまい		
	アイコンタクト・顔の向き	適切なアイコンタクト・顔の向き		
声の大きさ・スピード・音調	適切な声の大きさ・スピード・音調			
言葉づかい	丁寧で、わかりやすい言葉づかい			
積極的な傾聴	開放質問等を用いた積極的な傾聴			
共感・態度	共感の言葉がけ・態度			
患者への配慮	患者に対して不快・疼痛への配慮			